

子宮頸がんワクチン のおはなし



はらまちスマイルクリニック
山下 匠

子宮頸がんってなんだろう？

♥ 毎年約**3,000人弱**の方が亡くなる疾患

→手術等で治療を行えた場合でも

出産ができなくなる

その他身体の後遺症を残す（排尿障害、下肢浮腫など）

ことがある・・・

♥ 「**mother killer**」ともよばれる

→その原因が「**ヒトパピローマウイルス（HPV）**」

ヒトパピローマウイルス（HPV） ってなんだろう??

- ♥ HPVが原因で生じる病気 ⇨ 子宮頸がん
それ以外に・・・

中咽頭がん（のど）、肛門がん、膣がん
外陰がん（おまた）、陰茎がん（おちんちん）

⇨ **男性にもがんを生じるウイルス**

感染を予防するワクチンがあります！

- ♥ どうやって感染するの??

→ **性交渉**で感染します！

→ **その前に、予防しておくことが非常に重要！**

HPVワクチン ってなんだろう？



- ♥ HPVワクチンは世界的に接種されている
→接種の進んでいる国々では

子宮頸がんは大幅に減少！！

- ♥日本では・・・

残念ながら接種が進んでいない！！

子宮頸がんの発症抑制について後進国...

HPVワクチン

♥定期接種（お金がかからない期間）

小学6年生～高校1年生までの女性

♥接種スケジュール


（シルガード9（9価ワクチン）の場合）

→ **3回接種！**

→ 1回目－2回目：2か月間隔

2回目－3回目：4か月間隔

※15歳未満で1回目を打つと2回接種（6か月間隔）



※任意接種（お金がかかります）ですが

男性も接種可能!!（「ガーダシル」（4価ワクチン））

→推奨されるスケジュール → 3回接種！

1回目－2回目：2か月間隔・2回目－3回目：4か月間隔

HPVワクチン

♥副反応について・・・

詳細な臨床研究、統計解析（＝科学的検討）により

— HPVワクチンにより、**重篤な合併症リスクは高くないと科学的に証明されています。**

♥予防接種ストレス関連反応（ISRR）

様々な「不安」に伴って生じやすい症状です

HPVワクチン特有の副反応ではなく

HPVワクチン以外のワクチン等でも生じる場合がある

⇒**HPVワクチンにより増えてしまう症状ではない！**

♥HPVワクチン接種に対して不安を感じている

接種するか迷っているならばぜひご相談ください！

接種をするかどうか、一緒に考えましょう☆

小児科医から 接種対象のみなさんへ

- ♥いまいるパートナー
- ♥将来のパートナー
- ♥いつかいるかもしれない自分の子どもたち

想像するのは難しいかもしれないけど...

大切な人たちとの楽しい未来のために
いま、ワクチンを打ちませんか??